CLOROFYL très digestible

RAY-GRASS D'ITALIE

non alternatif - diploïde

Obtention : RAGT 2n
Inscription : 2007
Dose de semis conseillée : 25 kg/ha
Durée de la culture : 2 ans

mode d'emploi

Ensilage très digestible (plus de feuilles et tiges plus digestibles) suivi de foin (remontaison). Foin ou pâturage ensuite.

confort éleveur

Clorofyl est plus pérenne que les témoins diploïdes : plus grande tolérance aux maladies et reprise après le sec améliorée.

efficacité élevage

Très grande valeur alimentaire : feuilles plus digestibles, tiges également plus digestibles, plus de feuilles et moins de tiges.
Clorofyl, c'est jusqu'à 44 tMS/ha produites dans nos centres de recherche en 2 ans !
Et 14 tMS/ha produites sur l'année caniculaire de 2003 dans le Sud du Massif Central !

ingestion

La digestibilité influence la vitesse de transit et donc l'ingestion. Des tiges moins nombreuses et plus digestibles favorisent l'ingestion des fourrages stockés. Un feuillage sain permet également de sécuriser l'ingestion.
Une telle productivité associée à une grande digestibilité, **Clorofyl**, c'est l'assurance d'ingérer plus sur moins de surface.



Source : RAGT Semences

www.ragt-fourrageres.com
RAGT Semences • Rue Emile Singla • 12000 Rodez
RCS Rodez 431 899 756 • SAS au capital de 43 475 010 €

Les renseignements fournis dans ce document ne sont donnés qu'à titre indicatif et peuvent varier en fonction des conditions agronomiques et climatiques ainsi que des techniques culturales. La résistance aux maladies concerne les maladies, ou souches, actuellement connues et étudiées en France.